

<b>СССР</b> Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР	<b>ГОСУДАРСТВЕННЫЙ          СТАНДАРТ</b>	<b>ГОСТ</b> <b>13055—67</b>
	<b>ШКУРЫ ВОЛКА И ШАКАЛА          НЕВЫДЕЛАННЫЕ</b> Wolf and jackal skins undressed	Взамен ОСТ НКЗар 387 и ГОСТ 6609—53
		Группа С82

1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкуры волка и шакала из отряда хищных, семейства собачьих.

2. Зимние шкуры волка имеют волосяной покров темно- и светло-голубого, темно- и светло-серого, серо-бурого и темно-рыжего цветов. По характеру волосяного покрова шкуры волка подразделяют на мягкий—лесной и грубый—степной.

3. Зимние шкуры шакала имеют волосяной покров темно-серого или ржаво-серого цветов с буроватой полосой по хребту.

4. Шкуры волка и шакала должны быть сняты трубкой с разрезом по огузку, с сохранением меха головы, лап и хвоста; очищены от прирезей мяса, костей из лап и хвоста, хрящей и сухожилий; хорошо обезжирены, оправлены волосом наружу по установленной форме и законсервированы пресно-сухим способом.

5. В зависимости от качества волосяного покрова и районов распространения волка шкуры подразделяют по кряжам в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

Наименование кряжей	Главные районы распространения	Характеристика волосяного покрова
1. Полярный	Камчатская область; Чукотский национальный округ Магаданской обл.; северные районы Якутской АССР; Таймырский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий национальные округа; Мурманская область	Особо пышный, светло- и темно-голубого цвета с серо-голубым пухом; ость блестящая. Черевое рослое, шелковистое. Хвост пушистый

Внесен  
Центросоюзом

Утвержден Комитетом стандартов,  
мер и измерительных приборов  
при Совете Министров СССР  
12/VII 1967 г.

Срок введения  
1/VII 1968 г.

Продолжение

Наименование кряжей	Главные районы распространения	Характеристика волосяного покрова
2. Сибирский	Восточная и Западная Сибирь, кроме областей и округов, указанных в полярном кряже; Свердловская, Челябинская и Курганская обл.; Северо-Казахстанская, Кокчетавская, Павлодарская, Семипалатинская и Восточно-Казахстанская обл Казахской ССР	Пышный и грубоватый серо-голубой, темно-серый с голубым пухом или серо-буроватым оттенком по хребту
3. Казахский	Казахская ССР, за исключением областей, указанных в Сибирском кряже; северная часть Киргизии	Пышный светло-серого цвета и голубоватый серовато-желтого цвета
4.Централь-ный	Белорусская, Латвийская, Литовская и Эстонская ССР; Европейская часть РСФСР, за исключением районов, указанных в Южном кряже	Менее пышный, грубоватый и грубый серого и темно-серого цвета с серо-бурым оттенком по хребту
5. Южный	Украинская, Туркменская, Таджикская, Молдавская, Грузинская, Арммянская и Азербайджанская ССР; южные районы Киргизской ССР, Ставропольский край, Краснодарский край, Дагестанская, Кабардино-Балкарская, Северо-Осетинская и Чечено-Ингушская АССР	Грубоватый и грубый светло-серого, серовато-желтого и темно-рыжего цвета по хребту

## Примечания

1. Шкуры, поступающие из районов, не перечисленных в табл. 1, относят к тому кряжу, которому они соответствуют по качеству волосяного покрова.

2. Шкуры шакала по кряжам не подразделяют

6. В зависимости от качества волосяного покрова и мездры шкуры волка и шакала подразделяют на сорта в соответствии с требованиями табл. 2.

Таблица 2

Сорта	Характеристика волосяного покрова и мездры шкур
Первый	Полноволосый, с развившимся волосяным покровом, с высокой частой остью и густым пухом; мездра чистая
Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимся остью и пухом, мездра синеватая
Третий	Полуволосый, с низкими остью и пухом; мездра синяя

7 В зависимости от наличия пороков шкуры волка и шакала подразделяются на группы дефектов в соответствии с требованиями табл 3.

Таблица 3

Пороки	Группы дефектов		
	Малыи	Среднии	Большой
1 Разрывы общей длиной к длине шкуры в %	20,1—40,0	40,1—80,0	Более 80,0 до однократной длины шкуры
2 Дыры и вытертые места общей площадью к площади шкуры в %	0,5—1,0	1,1—2,0	2,1—4,0
3 Пешинны общей площадью к площади шкуры в %	До 0,5	0,6—1,0	1,1—2,0
4 Признаки весенней типки	Не допускаются	Шкуры ранне-весенние, перерезанные с поредением волосяным покровом на боках, огузке или шейной части	Шкуры весенние со значительной потертойостью волосяного покрова на боках, огузке или с сильно поредевшим волосяным покровом на шейной части и лопатках

Примечание Шкуры волка и шакала, имеющие разрывы общей длиной до 20% длины шкуры, дыры и вытертые места до 0,5% площади шкуры, дефектными не считают

8. На дефектных шкурах допускается не более одного из перечисленных пороков данной группы.

При совокупности различных пороков допускается:

на шкурах, относимых к группе дефектов «средний», два различных порока группы дефектов «малый»;

на шкурах, относимых к группе дефектов «большой», два различных порока группы дефектов «средний».

При совокупности одного порока, относимого к группе дефектов «средний», и двух пороков, относимых к группе дефектов «малый», шкуры переводят в группу дефектов «большой».

9 Шкуры волка и шакала, пороки которых превышают нормы, установленные для группы дефектов «большой», шкуры поздневесенние в стадии явной линьки с выпадающим во-

лосяным покровом, летние, шкурки детенышей с пухлявым волосяным покровом, а также шкуры прелые, горелые, поврежденные молью и кожедом оцениваются не более 25% стоимости первого сорта.

10. Упаковку и маркировку шкур волка и шакала производят по ГОСТ 12266—66.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

## ТАБЛИЦА

оценки качества шкур волка и шакала в процентах  
и стоимости первого сорта  
(рекомендована Центросоюзом)

Сорта	Нормальные	Группы дефектов		
		Малый	Средний	Большой
Первый	100,0	90,0	75,0	50,0
Второй	75,0	67,5	56,3	37,5
Третий	50,0	45,0	37,5	25,0

## Скидки от зачетной стоимости в %

За необезжиренность . . . . .	10
За отсутствие меха головы . . . . .	10
За отсутствие меха головы с шеей или черева . . . . .	25
За комовую сушку . . . . .	25

**ВНЕСЕН Центросоюзом**

Член правления Центросоюза Горностаев С. Т.

**ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ** отделом легкой промышленности Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР

Начальник отдела Богатов А. В.

Инженер Чацкая Л. С.

**УТВЕРЖДЕН** Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР

Председатель научно-технической комиссии (зам. председателя Комитета) Милованов А. П.

Зам. председателя комиссии Богатов А. В. (член Комитета)

Члены комиссии—Антоновский А. И., Данилова В.С.

**Изменение № 1 ГОСТ 13055—67 Шкуры волка и шакала невыделанные**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10.06.88 № 1707**

**Дата введения 01.01.89**

Наименование стандарта дополнить словами «Технические условия»; «Specifications».

Под наименованием стандарта проставить код ОКП 98 7852, 98 7853

Пункт 5 Таблицу 1 дополнить примечанием — 3 «3 Основным показателем кряжа является характеристика волосяного покрова Районы распространения являются дополнительным признаком»

Пункт 9 изложить в новой редакции «9 Шкуры с пороками, превышающими нормы, установленные для группы дефектов «большой», шкуры поздневе-

*(Продолжение см с 360)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 13055—67)*

сенные в стадии явной линьки с выпадающим волосианым покровом, летние, шкурки детенышей с пухлявым волосианым покровом, а также шкуры прелые, горелые, поврежденные молью и кожеедом, относят к нестандартным».

Приложение дополнить словом: **«Обязательное»;**

таблицу дополнить примечанием: **«Примечание. Шкуры нестандартные оценивают не более 25 % от качества первого сорта группы «нормальная»;**  
**«Скидки от зачетной стоимости, %» изложить в новой редакции:**

**«10 — за необезжиренность, за отсутствие головы;**

**25 — за отсутствие головы с шей или черева, за комовую сушку».**

**(ИУС № 9 1988 г.)**